

위산 분비 억제  
위 점막 보호  
*H.pylori* 억제

대웅제약  
www.daewoong.co.kr



Ideal treatment of peptic ulcer  
**Albis® / Albis D®**  
Ranitidine 75/150mg Sucralfate 300/600mg Bismuth 100/200mg

- 3가지 성분의 복합제로 이상적인 위염·궤양 치료제
- Ranitidine 위산 분비 억제
  - Sucralfate 위 점막 보호 및 회복 촉진
  - Bismuth *H.pylori* 억제

저용량 아스피린으로 인한 미란성 위염 발생 감소  
Ranitidine 단독에 비해 십이지장궤양의 치료율 우수

Medtronic

# How many of your DBS patients may need an MRI?

## INTRODUCING THE WORLD'S 1<sup>ST</sup> DBS PORTFOLIO FOR FULL BODY MRI


CONDITIONALLY SAFE SCANS\*

This labelling also applies to patients already implanted with an Activa® system\*  
\* For a listing of indications, contraindications, precautions, MRI compatibility of specific Activa® devices, MRI conditional labelling, warnings and potential adverse events, please refer to the instructions for use.




### WHAT MAKES MEDTRONIC DBS DEVICES UNIQUE?

- FILTERED FEED THROUGH TECHNOLOGY**  
helps to dissipate RF energy to enable MRI conditional safety.
- MINIMAL FERROMAGNETIC MATERIAL**  
reduces interaction with the magnet.
- PROTECTIVE DIODES**  
help prevent device failure when exposed to electromagnetic interference.




대한정위기능신경외과학회 제22회 정기학술대회

# 2016 대한정위기능신경외과학회 제22회 정기학술대회



일시 | 2016년 3월 26일(토) 07:30-18:00  
장소 | 아주대학교병원 별관 대강당

주최: 대한정위기능신경외과학회  
주관: 대한신경외과학연구재단



**알포아티린®**  
choline alfoscerate 400mg

## 뇌기능 개선제

유한양행  
www.yuhan.co.kr

**알포아티린 (Choline Alfoscerate)**  
[성분·함량] 1 캡슐 중 폴리 알포세레이트(염류) 400mg [효능·효과] 1. 뇌혈관 결손에 의한 2차 증상 및 변성 또는 퇴행성 뇌질환성 정신증후군: 기억력저하와 착란, 의욕 및 자발성저하로 인한 방향감각장애, 의욕 및 자발성 저하, 집중력감소. 2. 감정 및 행동변화: 정서불안, 자각과민성, 주위무관심. 3. 노인성 가상우울증. [용법·용량] 폴리알포세레이트로서 1회 400mg을 1일 2-3회 경구투여한다. 증상에 따라 적절히 증감한다. [사용상의 주의사항] 1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오. 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응 환자. 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성. 2. 이상반응 1) 2차적인 도파민 작용에 기인한다고 추정되는 구역이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량 투여합니다. 2) 소화기계: 위염, 위궤관. 3) 정신신경계: 졸음, 불면, 착각성, 신경질, 경련, 운동과다. 3. 보관 및 취급상의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다. 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의합니다. [저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 ※ 연질캡슐이 녹거나 변형될 수 있으므로 직사광선 및 고온다습한 곳을 피하여 보관하십시오. [사용기한] 외부포장에 표기 ※ 플리스트 포장의 제조번호 / 사용기한 표시 방법은 아래와 같습니다. 예) 제조번호 #2001, 사용기한 2015년 1월 6일인 경우 → "2001 / 150106"로 표시 [포장단위] 100캡슐



